

## НАВ-паклітаксел / Карбоплатин ХС774 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	НАВ-паклітаксел	100	-	0	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>НАВ-паклітаксел</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

**Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):**

**Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).**

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Socinski M.A. et al., J Clin Oncol 30: 2055ff, 2012.

