

Пеметрексед ХС800 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Пеметрексед | 500 | 0,9% NaCl | 100 мл | 10 хвилин | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пеметрексед | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

За 1-3 тижні до початку терапії Пеметрекседом:

- Заміщення із застосуванням 350 - 1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3 тижнів після завершення терапії.

- Заміщення вітаміном В12: 1000 мкг в/м (один раз на 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.

- Оральний прийом Дексаметазону - 8 мг перорально щодоби протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку прийому Пеметрекседу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Hanna N. et al., J Clin Oncol 22: 1589ff, 2004.

