

## Ерлотиніб ХА149 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Ерлотиніб	150	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ерлотиніб																														
[Графік показує постійний прийом препарату протягом 31 днів]																														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом

Повторно: \* Постійний прийом.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Shepherd F.A. et al., N Engl J Med 14: 353ff, 2005;  
Rosell R. et al., Lancet Oncol 13: 239ff, 2012.

