

## FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 1 Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Флюороурацил	500	0,9% NaCl	100 мл	20 хвилин	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	500	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Епірубіцин	100	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Флюороурацил</b>																					
<b>Циклофосфамід</b>																					
<b>Епірубіцин</b>																					

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3**

#### Примітка:

**Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).**

**Увага! В обов'язковому порядку показана - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 2.**

**Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)**

**(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**

**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**

