

## FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 2 Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3

#### Примітка:

Увага! Дана схема дійсна і застосовується після схеми - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 1.

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація:

Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Roche H. et al., J Clin Oncol 24: 5664ff, 2006.

