

## Пертузумаб / Трастузумаб / Доцетаксел ХА082 + ХА110 + ХС416 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Пертузумаб	420 мг (const)	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Трастузумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	500 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Пертузумаб</b>																					
<b>Трастузумаб</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
**22 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
**6**

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

(\*) "Фіксована навантажувальна доза" Трастузумабу - 8 мг/кг, зі швидкістю першого введення протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин. Трастузумаб також можна призначати підшкірно у постійній дозі 600 мг/5 мл.

(\*) "Фіксована навантажувальна доза" Пертузумабу - 840 мг, зі швидкістю першого введення протягом 60 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

#### Супутня медикація:

Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Baselga J. et al., N Engl J Med 366: 109ff, 2012; Swain S.M. et al., Lancet Oncol 14: 461ff, 2013; Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

