

## Циклофосфамід / Ліпосомальний комплекс Доксорубіцину цитрату ХС452 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату	60	0,9% NaCl	100 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	600	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату</b>																					
<b>Циклофосфамід</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Ліпосомальний комплекс доксорубіцину цитрату розводять до 0,4-1,2 мг/мл.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду (якщо загальна доза становить >1000 мг) внутрішньовенно або перорально за 2 години до та через 2 і 6 год. відповідно, після прийому Циклофосфаміду. Належний діурез.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Batist G. et al., J Clin Oncol 19: 1444ff, 2001.

