

Циклофосфамід / Ліпосомальний комплекс Доксорубіцину цитрату ХС452 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1	Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату	60	0,9% NaCl	100	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	600	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ліпосомний комплекс доксорубіцину цитрату																					
Циклофосфамід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Ліпосомальний комплекс доксорубіцину цитрату розводять до 0,4-1,2 мг/мл.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду (якщо загальна доза становить >1000 мг)

внутрішньовенно або перорально за 2 години до та через 2 і 6 год. відповідно, після прийому Циклофосфаміду.

Належний діурез.

Література:

Batist G. et al., J Clin Oncol 19: 1444ff, 2001.

