

# Пегільована ліпосомальна композиція Доксорубіцину ХС452 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Пегільований ліпосомальний доксорубіцин	50	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Пегільований ліпосомальний доксорубіцин</b>																												

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

### Примітка:

Пегільовану ліпосомальну композицію доксорубіцину розчиняють у 250 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза  $\leq 90$  мг та у 500 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза перевищує 90 мг.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

### Література:

O'Brien M.E., Ann Oncol 15: 440ff, 2004.

