

Доцетаксел / Карбоплатин / Трастузумаб ХА110 + ХС184 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Трастузумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					
Карбоплатин																					
Трастузумаб																					

Додаткова інформація

Кількість циклів: Підсилювач Трастузумабу протягом 1 року;
Доцетаксел та Карбоплатин протягом 6 циклів.

Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 днів, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

(*) "Фіксована навантажувальна доза" Трастузумабу - 8 мг/кг, зі швидкістю першого введення протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Трастузумаб також можна призначати підшкірно у постійній дозі 600 мг/5 мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Slamon D. et al., N Engl J Med 365 (14): 1273ff, 2011; Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

