

Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (доба 1), ХС592 (доба 8) (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Гемцитабін	750	0,9% NaCl	250	30 хвилин	внутрішньовенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Гемцитабін																					
■							■														
Цисплатин																					
■							■														

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ \geq 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Література:

Nagourney RA et al., J Clin Oncol 18: 2245ff, 2000.

