

Капецитабін + Бевацизумаб ХА060 (європейський протокол) Рак молочної залози

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Бевацизумаб | 15 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 | 90 хвилин | внутрішньовенно |
| 1-14 | Капецитабін | 2000 | - | 0 | - | перорально |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Бевацизумаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капецитабін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Капецитабін: 2000 мг/м² розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Зверніть увагу!

• Капецитабін (Capecitabini). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.
Кількість капсул в упаковці: 60 шт., 120 шт.
Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

Література:

Robert J.N. et al., J Clin Oncol 29: 1252ff, 2011.

