

Капецитабін / Доцетаксел ХС412 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250	1 година	внутрішньовенно
1-14	Капецитабін	2500	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					
Капецитабін																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Капецитабін: 2500 мг/м² розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

Зверніть увагу!

• Капецитабін (Capecitabini). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Кількість капсул в упаковці: 60 шт., 120 шт.

Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

Література:

O'Shaughnessy J. et al., J Clin Oncol 20: 2812ff, 2002.

