

Капецитабін / Лапатиніб ХА149 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-14	Капецитабін	2000	-	0	-	перорально
1-21	Лапатиніб	1250 (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабін																					
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Лапатиніб																					
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Капецитабін, доба 22.

Лапатиніб - тривалий прийом.

Капецитабін: 2000 мг/м² розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

Зверніть увагу!

• Капецитабін (Capecitabini). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Кількість капсул в упаковці: 60 шт., 120 шт.

Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

• Лапатиніб (Lapatinibi). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 250 мг. Кількість капсул в упаковці: 28 шт., 35 шт., 42 шт., 70 шт. Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

Література:

Geyer C.E. et al., N Engl J Med 355: 2733ff, 2006.

