хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Капецитабін / Лапатиніб XA149 (європейський протокол) Рак молочної залози

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | Капецитабін | 2000 | - | 0 | - | перорально |
| 1-21 | Лапатиніб | 5 x 250 | - | 105 шт | - | перорально |

**Графік введення препаратів:**




## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
**22 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
**6**

**Примітка:**
**Капецитабін, доба 22.**
**Лапатиніб - тривалий прийом.**
**Капецитабін: 2000 мг/м$^2$ розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.**
**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**
**Geyer C.E. et al., N Engl J Med 355: 2733ff, 2006.**