

Капецитабін / Лапатиніб ХА149 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-14	Капецитабін	2000	-	0	-	перорально
1-21	Лапатиніб	5 x 250	-	105 шт	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабін																					
Лапатиніб																					

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

Капецитабін, доба 22.

Лапатиніб - тривалий прийом.

Капецитабін: 2000 мг/м² розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Geyer C.E. et al., N Engl J Med 355: 2733ff, 2006.

