

## Лапатиніб + Трастузумаб ХА110 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-21	Лапатиніб	4 x 250	-	84 шт	-	перорально
1	Трастузумаб	6* мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Лапатиніб</b>																					
<b>Трастузумаб</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Лапатиніб - тривалий прийом.

Трастузумаб, доба 22.

(\*) "Фіксована навантажувальна доза"

Трастузумабу - 8 мг/кг, зі швидкістю першого введення протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Трастузумаб також можна призначати підшкірно у постійній дозі 600 мг/5 мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Blackwell K.L. et al., J Clin Oncol 28: 1124ff, 2010;  
Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

