

Лапатиніб + Трастузумаб ХА110 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-21	Лапатиніб	1000 (const)	-	0	-	перорально
1	Трастузумаб	6* мг/кг	0,9% NaCl	250	90 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Лапатиніб																					
[Графік показує щоденне введення препаратів протягом 22 днів]																					
Трастузумаб																					
[Графік показує одне введення препарату на першому дні]																					

Додаткова інформація

Примітка:

Лапатиніб - тривалий прийом.

Трастузумаб, доба 22.

(*) "Фіксована навантажувальна доза"

Трастузумабу - 8 мг/кг, зі швидкістю першого введення протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Трастузумаб також можна призначати підшкірно у постійній дозі 600 мг/5 мл.

Зверніть увагу!

• Лапатиніб (Lapatinibi). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 250 мг. Кількість капсул в упаковці: 28 шт., 35 шт., 42 шт., 70 шт. Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

Література:

Blackwell K.L. et al., J Clin Oncol 28: 1124ff, 2010;

Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

