

Трастузумаб-Емтанзин ХА112 (європейський протокол) Рак молочної залози

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Трастузумаб - Емтанзин | 3,6 мг/кг | 0,9% NaCl | 250 | 90 хвилин | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Трастузумаб - Емтанзин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12

Примітка:

Перше введення Трастузумабу - Емтанзину - протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Введення лише із застосуванням вбудованого фільтра.

Література:

Verna S. et al., N Engl J Med 367: 1783ff, 2012.

